



ESTO ES UN HECHO

VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/ LATINOS EN GEORGIA

De acuerdo con el censo realizado en el año 2005, había 625.028 Hispanos/Latinos en el estado de Georgia.


La población Hispana/Latina creció un 30 por ciento desde el año 2000 hasta el 2005 en Georgia. Entre los 625.028 Hispanos/Latinos, el 63 por ciento eran Mexicanos, el ocho por ciento Puerto Riqueños, el tres por ciento Cubanos, y el 26 por ciento otros Hispanos de diferentes orígenes.

El número de casos nuevos reportados con SIDA, han disminuido desde mediados de 1990, no solo en Georgia sino en toda la nación. Este descenso es más probable que se deba a las efectivas terapias que retardan o previenen la aparición del SIDA en personas quienes tienen el VIH (positivas).

El reporte de confidencial de personas VIH positivas (No de SIDA) empezó en Diciembre 31 del 2003. Esto ha hecho que aumente el número de personas diagnosticadas con VIH/SIDA. Habían 60 casos de Hispanos/Latinos con VIH/SIDA en el año 2000 y para el año 2005, el número de casos habían aumentado a 109 (ver gráfica).

Fuente: United States Census Bureau (2000), and Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (July 2007).

Source: United States Census Bureau (2000)



*Otros incluyen Asiáticos, Personas Nativas de Hawaii y de las Islas del Pacífico, Indios Americanos Nativos de Alaska, Personas de origen Multirracial y Razas desconocidas.

Esto es un Hecho

Había 1.065 Hispanos/Latinos viviendo con SIDA en Georgia, en Diciembre 2005.

En el 2005, la tasa de adultos/adolescentes Hispanos/Latinos con SIDA en Georgia fue de (23.2 por 100.000) mas del doble de la tasa de los Blancos (8.7 por 100.000). Los latinos tienen la Segunda tasa más alta en Georgia.

Durante los años 2000-2005, más del 77 por ciento de los casos de SIDA entre Hispanos/Latinos, en Georgia, han sido entre hombres.

El reporte más alto de Hispanos/Latinos diagnosticados con SIDA en 2005, fué el de los hombres que tienen sexo con hombres (MSM) (18 por ciento), seguido por contactos heterosexuales (10 por ciento), transfusión/hemofilia (11 por ciento), drogas ilegales inyectadas (IDU) y MSM (cuatro por ciento), sin embargo la mayoría fue clasificada como factores de riesgo no identificados (66 por ciento).

Entre los encuestados en Georgia en el 2001 por el Sistema de Vigilancia del Comportamiento de factores de Riesgo (BRFSS por sus siglas en inglés) (48 por ciento) eran Hispanos/Latinos. Estos estaban menos enterados acerca del tratamiento para mujeres embarazadas con VIH y sus bebés que las mujeres Blancas (46 por ciento), que las Afro-Americanas (38 por ciento) y que las personas de otros grupos raciales (49 por ciento).

Fuente: United States Census Bureau (2000), and Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Julio 2007) y Georgia Division of Public Health, Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) (2001).

Para mayor información sobre estadísticas de HIV/SIDA contacte al Proyecto TAKE, VIH/SIDA del Georgia Office of Health Improvement al (404) 463-2289 o visite www.hiv-aidstakeproject.org